

## ROOTER

### NAWÓZ WE

#### Roztwór nawozowy PK 13 – 5

**Zawartość składników pokarmowych w % (m/m):**

13,0 % pięciotlenku fosforu ( $P_2O_5$ ) rozpuszczalnego w wodzie

5,0 % tlenku potasu ( $K_2O$ ) rozpuszczalnego w wodzie

**Masa netto: 1,16 kg / 5,8 kg**

**Objętość: 1 l / 5 l**

**Producent:**

Laboratoires Goëmar SAS

Parc Technopolitain Atalante CS 41908

35435 Saint-Malo Cedex

Republika Francuska

tel.: +33 2 99 19 19 19

**Dystrybutor:**

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6 B

01-756 Warszawa

Tel.: +48 22 866 41 80

**Przechowywanie:**

- chronić przed dziećmi,
- przechowywać w temperaturze od  $-10^{\circ}C$  do  $40^{\circ}C$ ,
- przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku,
- z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt,
- w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
- przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.

**Środki ostrożności:**



Niebezpieczeństwo

H290 - Może powodować korozję metali.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P264 - Dokładnie umyć ręce po pracy

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

**ROOTER** został wyprodukowany w oparciu o unikalną i opatentowaną technologię PhysioActivator™. ROOTER stymuluje rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza jego regenerację, poprawia pobieranie składników mineralnych z gleby.

#### **INSTRUKCJA STOSOWANIA**

**ROOTER stosować jako roztwór wodny za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin, najlepiej techniką oprysku drobnokroplistego tak, aby zapewnić całkowite zwilżenie roślin.**

<b>Zakres stosowania</b>	<b>Termin stosowania</b>	<b>Liczba zabiegów</b>	<b>Dawka</b>
Rzepak ozimy	Jesienią w fazie 4-6 liści; Wiosną po rozpoczęciu wegetacji	1-2	1 l/ha - opryskiwanie
Zboża	Od fazy 3 liści do końca krzewienia	1-2	1 l/ha - opryskiwanie

#### **Sporządzanie cieczy użytkowej:**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość nawozu wlać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napelnionego **wodą do 2/3 potrzebnej objętości (przy włączonym mieszadle)**. Opróżnione opakowania przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku stosowania w mieszaninie **z innymi nawozami i/lub środkami ochrony roślin**, ROOTER dodawać do zbiornika jako ostatni (przy włączonym mieszadle).

**Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha. Dawkę wody dostosować do fazy rozwojowej rośliny uprawnej.**

**Numer partii:** na opakowaniu.

**Data produkcji:** na opakowaniu.

**Okres przydatności nawozu do stosowania – 3 lata**