

COLORADO

NAWÓZ WE

Mieszanina mikroskładników pokarmowych Mangan (Mn) + Cynk (Zn)

Zawartość składników pokarmowych w % (m/m):

1,83 % manganu (Mn) rozpuszczalnego w wodzie

1,9 % cynku (Zn) rozpuszczalnego w wodzie

Masa netto: 5,9 kg

Objętość: 5 l

Producent:

Laboratoires Goëmar SAS
Parc Technopolitain Atalante CS 41908
35435 Saint-Malo Cedex
Republika Francuska
tel.: +33 2 99 19 19 19

Dystrybutor:

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6 B
01-756 Warszawa
Tel.: +48 22 866 41 80

Przechowywanie:

- chronić przed dziećmi
- przechowywać w temperaturze od -10°C do 40°C,
- przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku,
- z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt,
- w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Środki ostrożności:



Niebezpieczeństwo

H315 - Działa drażniąco na skórę

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P332+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

COLORADO zostało wyprodukowane w oparciu o unikalną i opatentowaną technologię PhysioActivator™. COLORADO poprawia wybarwienie i odżywienie dojrzewających owoców.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

COLORADO stosować jako roztwór wodny za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin, najlepiej techniką oprysku drobnokroplistego tak, aby zapewnić całkowite zwilżenie liści i owoców.

Zakres stosowania	Termin stosowania	Liczba zabiegów	Dawka
Jabłoń	4 tygodnie przed zbiorem, powtórzyć po dwóch tygodniach	2	5 l/ha
Pomidor, papryka	Od zawiązania owoców, powtarzać co 2 - 3 tygodnie	2 - 4	- uprawy polowe 2,5 - 5 l/ha - uprawy pod osłonami 0,3 - 0,5%

Sporządzanie cieczy użytkowej:

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zalecaną ilość nawozu wlać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego wodą do 2/3 potrzebnej objętości (przy włączonym mieszadle). Opróżnione opakowania przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku stosowania w mieszaninie z innymi nawozami i/lub środkami ochrony roślin, COLORADO dodawać do zbiornika jako ostatnie (przy włączonym mieszadle).

Zalecana ilość wody: 200 - 750 l/ha. Dawkę wody dostosować do fazy rozwojowej rośliny uprawnej oraz typu używanego opryskiwacza.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.

Numer partii: na opakowaniu.

Data produkcji: na opakowaniu.

Okres przydatności nawozu do stosowania – 3 lata